

Gebrauchsanweisung

INHALT

Naloc, 10 ml Lösung

INHALTSSTOFFE

Propylenglykol, Harnstoff, Milchsäure, Wasser, Natriumhydroxid

BESCHREIBUNG

Naloc ist eine klare, farblose Flüssigkeit, die in einer Kunststofftube mit einer Tropfspitze aus Silikon geliefert wird, um das Auftragen auf den Nagel zu erleichtern. Naloc ist frei von Konservierungs- und Duftstoffen. Die Inhaltsstoffe sind vollständig biologisch abbaubar.

INDIKATION

Naloc reduziert Nagelverfärbungen, die z.B. durch Nagelpilz verursacht sind und verbessert die Feuchtigkeitversorgung.

Naloc verbessert das Erscheinungsbild der Nägel und hält sie in gutem Zustand. Erste Effekte sind üblicherweise nach 2- bis 4-wöchiger Anwendung sichtbar.

ANWENDUNG

Naloc einmal täglich (am besten abends) auf die betroffenen Nägel auftragen. **Die Spitze der Tube auf den Nagel halten. Leichten Druck auf die Tube ausüben und die Lösung mit der Tubenspitze verteilen. Jeden Nagel mit einer dünnen Schicht der Lösung bedecken. Es ist wichtig, dass die Lösung auch unter dem freien Nagelende betroffener Nägel aufgetragen wird.** Nach der Anwendung den Nagel einige Minuten lang trocknen lassen.

Anzeichen für eine Verbesserung sind nach 2- bis 4-wöchiger Behandlung sichtbar.

In vielen Fällen kann eine 3- bis 6-monatige Anwendung erforderlich sein, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erreichen. Für optimale Ergebnisse sollte die Behandlung fortgesetzt werden, bis der Nagel nachgewachsen ist.

Das Auftragen von Nagellack während der Behandlung ist zu vermeiden, da dadurch die erwünschte Wirkung von Naloc vermindert wird.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht mit den Augen oder Schleimhäuten in Kontakt bringen. Nicht bei bestehenden Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe anwenden.

MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN

In einigen Fällen können vorübergehende geringfügige Hautreizungen der umliegenden Haut und Nagelverfärbungen auftreten. Weiterhin kann es zu einer Ablösung/Trennung des Nagels vom darunter liegenden Nagelbett (Onycholyse) sowie zu einer Ablösung des befallenen Teils des Nagels kommen.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Nur bis zum auf der Tube und auf dem Umkarton angegebenen Haltbarkeitsdatum verwenden. Zwischen 2° und 25° C lagern. Vor Sonnenlicht und Frost schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Vertrieb: MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Benzstraße 1, D-61352 Bad Homburg, Deutschland

Hersteller: Moberg Pharma AB, Gustavslundsv. 42, SE-167 51 Bromma, Schweden

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im August 2013

